

Рекомендации при зондовом питании : Перед каждым кормлением проверяйте, не сместился ли зонд; прием пищи только в сидячем положении; после приема пищи - сидячее положение не менее 30 минут; можно употреблять только жидкое питание (крем-суп, бульон, пюре из овощей); еду надо измельчать не в мясорубке, а в блендере, в пище не должно быть комочков; пища должна быть 38-40 градусов; расчет потребности в жидкости – 30 мл/кг веса; необходимо ухаживать за кожей носа человека, ежедневно менять гипоаллергенную накладку, тщательно очищать кожу носа; производить уход за полостью рта; уход за полостью рта; смена зонда 1 раз в 5 суток врачом хирургом поликлиники по месту жительства, решение вопроса о наложении гастростомы у терапевта/невролога в поликлинике по месту жительства; нутритивная поддержка с калорийностью 30-35 ккал/кг в сутки и содержанием белка не менее 1,5 г/кг в день; консультация диетолога и наблюдение логопеда; загустители и сипинги при оральном приеме в качестве дополнительного источника питания.

Какой нутрдринк?

Противопролежневые мероприятия

Соблюдение общей гигиены, уход за кожей, избегать травмирующих воздействий (растирание полотенцем и пр.), использование увлажняющих кремов в зонах с риском развития поражения кожи, исключить длительный контакт кожи с мокрым бельем (при непроизвольных физиологических отправлениях). Менять положение тела пациента каждые 2 часа (лежащий пациент) Использование противопролежневых матрасов, постельное белье, на котором лежит больной, должно быть сухим и чистым, мягким и не иметь складок (простыню нужно натягивать, фиксируя края матрасом или как-нибудь иначе), следить, чтобы в постели не было крошек.